

KUPROSAL 50

Typ : : E.1.3g Tlenochlorek miedzi

SKŁADNIKI POKARMOWE

Miedź (Cu) całkowita - 50,0 % (m/m)



Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Instrukcja stosowania nawozu

Nawóz mineralny w formie proszku, zawierający miedź (Cu) w postaci tlenochloru miedzi, przeznaczony do stosowania dolistnego. Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych. Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na miedź. Nawóz stosować, kiedy liście roślin są suche. Nie stosować przed spodziewanym deszczem.

Stosowanie:

- jabłonie i grusze: 1,5kg w 500-750 l wody/ha-stosować po ruszeniu wiosennej wegetacji do początku kwitnienia 1-2 zabiegi oraz po zbiorach owoców.
- wiśnie i czereśnie: 3kg w 500-750 l wody/ha po ruszeniu wegetacji i po zbiorach owoców lub w okresie kwitnienia 1,5kg 500-750l wody/ha.
- śliwy: 3kg w 500-700l wody/ha po ruszeniu wegetacji oraz 2-3kg w 500-700l wody/ha w okresie opadania liści.

- brzoskwinie: 5-7 kg/ha w 500-700 l wody bardzo wczesną wiosną i jesienią po opadnięciu liści.
- Pomidor : 2,5- 3kg/ha w 700 l wody, 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
- ogórek: 2,5-3 kg/ha w 700 l wody, gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą. Stosować 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
- Winorośl: 2,5 kg/ha w 500-900 l wody, przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni
- Porzeczki : 3,0kg/ha w 700 l wody, bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni
- Orzech włoski, orzech laskowy :2-3,0 kg/ha w 800-1000 l wody, od momentu pęknięcia paków do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich. Stosować 1-2 zabiegi w odstępach co 7-14 dni.
- Fasola szparagowa: 3,0 kg/ha w 600-800 l wody w czasie kwitnienia i po kwitnieniu. Stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni
- pozostałe uprawy: 0,5-1kg /ha w 500 l wody, w okresie intensywnego wzrostu.

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Przed zastosowaniem należy uwzględnić potrzeby poszczególnych upraw oraz warunków ich uprawy.

Przed sporządzeniem mieszaniny z innymi nawozami lub środkami ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza, należy wykonać test próbnego mieszania w małej objętości wody. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie - instrukcji środka stosowanego łącznie z nawozem.

Przygotowanie cieczy użytkowej

Przed sporządzeniem cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość nawozu wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a połączyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Przechowywanie

Nawóz przechowywać wyłącznie w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0 do 30⁰C z dala od źródeł ciepła, środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych zwłaszcza dzieci.

Środki ostrożności

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Unikać kontaktu produktu ze środkami zawierającymi Tiuram, z substancjami o silnych właściwościach kwasowych lub zasadowych.

Stosować tylko w razie konieczności – zaobserwowania niedoborów miedzi w roślinie. Istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności w szczególności w okresach chłodnej i wilgotnej pogody, oraz na niektórych odmianach drzew owocowych, winorośli i innych roślinach.

Nie stosować w ciągu dnia tam gdzie pszczoły mają pożytek.

Chronić przed dziećmi.

Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy, zabezpieczającą w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Unikać zanieczyszczania wód powierzchniowych i gleby. W przypadku rozsypania nawozu zebrać do pustego opakowania i przeznaczyć do utylizacji w porozumieniu ze specjalistami, w sposób zgodny z przepisami o odpadach.

Okres przydatności do stosowania: 3 lata

Masa netto:

Instrukcja transportu i przechowywania :

- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- Chronić przed wilgocią
- Ilość warstw składowania w magazynie – max 14
- Ilość warstw w czasie transportu – max 7
- Nawóz przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C

Data produkcji:

Partia:

Producent : Synthos Agro Sp. z o.o. , 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1