



Magic Miedź 380

Prosty nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy

Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych (m/m):

26% całkowitej miedzi (Cu)

Postać płynna.

Składniki:

Chlorek triwodorotlenek dimiedzi¹ (CAS: 1332-65-6); propan-1,2-diol¹ (CAS: 57-55-6); kwas naftalenosulfonowy, polimer z formaldehydem, sól sodowa¹ (CAS: 9084-06-4)

¹CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Instrukcje dotyczące stosowania:

Nawóz mineralny w formie płynnej, zawierający miedź (Cu) w postaci tlenochlorku miedzi, przeznaczony do stosowania dolistnego. Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych. Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na miedź. Nawóz stosować, kiedy liście roślin są suche. Nie stosować przed spodziewanym deszczem.

Orientacyjne dawki nawozu i terminy stosowania:

Uprawa	Dawka na hektar	Stosowanie
jabłonie i grusze	1,5 l w 500-750 l wody	Po ruszeniu wiosennej wegetacji do początku kwitnienia 1-2 zabiegi oraz po zbiorach owoców
wiśnie i czereśnie	3 l w 500-750 l wody	Po ruszeniu wegetacji i po zbiorach owoców
	1,5 l 500-750 l wody	W okresie kwitnienia
śliwy	3 l w 500-700 l wody	Po ruszeniu wegetacji
	2-3 l w 500-700 l wody	W okresie opadania liści
brzoskwinie	5-7 l w 500-700 l wody	Bardzo wczesną wiosną i jesienią po opadnięciu liści
pomidor	2,0-2,5 l w 700 l wody	2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni
ogórek	2,0-2,5 l w 700 l wody	Gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą. Stosować 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni
winorośl	3,0 l w 500-900 l wody	Przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni
porzeczka	3,0 l w 700 l wody	Bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni

orzech włoski, orzech laskowy	2-3,0 l w 1000 l wody	Od momentu pęknięcia pąków do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich. Stosować 1-2 zabiegi w odstępach co 7-14 dni
fasola szparagowa	2,0-2,5 l w 600-800 l wody	W czasie kwitnienia i po kwitnieniu. Stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni
zboża ozime i jare	0,2-0,5 l/ w 100-400 l wody	W okresie wegetacji, do 4 tygodni przed zbiorami
kukurydza, strączkowe	0,7-1,4 l w 100-400 l	W okresie wegetacji, do 4 tygodni przed zbiorami
rzepak	0,4-2,2 l w 100-400 l wody	W okresie wegetacji, do 4 tygodni przed zbiorami
ziemniak	1,7-2,5 l w 100-400 l wody	W okresie wegetacji do czasu ostatniego oprysku
burak cukrowy	1,4-2,7 l w 100-400 l wody	w okresie wegetacji do czasu ostatniego oprysku
pozostałe uprawy	0,5-1 l w 500 l wody	W okresie intensywnego wzrostu

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Przed zastosowaniem należy uwzględnić potrzeby poszczególnych upraw oraz warunków ich uprawy.

Przed sporządzeniem mieszaniny z innymi nawozami lub środkami ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza, należy wykonać test próbnego mieszania w małej objętości wody. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie - instrukcji środka stosowanego łącznie z nawozem.

Przygotowanie cieczy użytkowej:

Przed sporządzeniem cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość nawozu wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Skontaktuj się z firmą Synthos Agro Sp. z o.o. lub z dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zalecane warunki przechowywania i transportu:

- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Chronić przed wilgocią.
- Ilość warstw składowania w magazynie – max 3.
- Ilość warstw w czasie transportu – max 3.
- Nawóz przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.

Synthos Agro Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 847 47 77.

www.synthosagro.com

synthos
AGRO

Nawóz przechowywać wyłącznie w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0 do 30°C z dala od źródeł ciepła, środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych zwłaszcza dzieci.

Informacje dotyczące niebezpieczeństwa i ochrony środowiska:



Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.

P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P391 - Zebrać wyciek.

P501 – Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

KOD UFI: CE20-30YY-800N-CM1R

Unikać kontaktu produktu z substancjami o silnych właściwościach kwasowych lub zasadowych.

Stosować tylko w razie konieczności – zaobserwowania niedoborów miedzi w roślinie. Istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności w szczególności w okresach chłodnej i wilgotnej pogody, oraz na niektórych odmianach drzew owocowych, winorośli i innych roślinach.

Nie stosować w ciągu dnia tam gdzie pszczoły mają pożytek.

Chronić przed dziećmi.

Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy, zabezpieczającą w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Unikać zanieczyszczania wód powierzchniowych i gleby. W przypadku rozsypania nawozu zebrać do pustego opakowania i przeznaczyć do utylizacji w porozumieniu ze specjalistami, w sposób zgodny z przepisami o odpadach.

Maksymalna dawka stosowania 28 kg Cu/ha przez okres 7 lat (tj. średnio 4 kg/ha/rok) nie może być przekroczona na tej samej działce nawet przy stosowaniu innych preparatów i nawozów na bazie miedzi.

Masa netto:**Postać:** ciecz**Okres przydatności:**

2 lat od daty produkcji (na opakowaniu)

Producent:

SYNTHOS AGRO Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
tel.: +48 33 847 47 77,
e-mail: rejestracja@synthosgroup.com

Numer partii produktu: