

Z MYŚLĄ
O POLSKIM
ROLNIKU

synthos
AGRO

GROT

18 EC

- Skutecznie zwalcza przędziorki, wciornastki i miniarki w uprawach szklarniowych: warzywnych, ozdobnych oraz małoobszarowych.
- Po jego zastosowaniu szkodniki przestają żerować w ciągu kilku godzin.
- Mechanizm działania polegający na zaburzeniu funkcjonowania układu nerwowego roztoczy i owadów.
- Długotrwałe działanie ze względu na bezpośrednie wnikanie do wnętrza liścia (w ciągu 6-8 h).
- Brak uodpornienia się szkodników na substancję czynną abamektyna.
- Wysokiej jakości formułacja wspomagająca przyczepność środka do rośliny.



WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.SYNTHOSAGRO.COM

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Uprawa	Szkodniki	Zalecana dawka/ha	Termin stosowania
Oberżyna, ogórek papryka, pomidor	przędziorek chmielowiec	0,05% (50ml środka w 100 litrach wody)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 7 dni.
Chryzantema	przędziorek chmielowiec, wciornastek zachodni	0,05% (50ml środka w 100 litrach wody)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 7 dni.
Róża	przędziorek chmielowiec	0,05% (50ml środka w 100 litrach wody)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 7 dni.
Gerbera	miniarki	0,05% (50ml środka w 100 litrach wody)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 7 dni.
Truskawka	przędziorek chmielowiec	1,2 l/ha	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99). Stosować raz w sezonie.

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Rekomendacja Eksperta ŚOR

Oprysk najlepiej wykonać wczesnym wieczorem lub w nocy, aby substancja aktywna nie była narażona na działanie promieniowania UV.