

synthos
AGRO

NOWOŚĆ




PAKI
KUKURYDZIANE

2025

KATALOG PRODUKTOWY





2-21 Fungicydy

- 2 Miedzian 50 WP
- 8 Miedzian Extra 350 SC
- 13 Kaptan Zawiesinowy 50 WP
- 15 Kapduo ReNovo 72,5 WG
- 18 Tores 250 EC

22-41 Herbicydy

- 22 Mezoftor 103 SC
- 24 Donna Cornleone
- 26 Orkan 350 SL
- 27 Tazoprym 500 SC
- 29 Premier 300 SL
- 30 Premier 750 SL
- 31 Premier D 750 SL
- 33 Hexypyr 200 EC
- 35 Mentum 040 OD
- 36 Hadar 360 CS
- 37 Effendi 500 SC
- 38 Flutax 150 EC
- 40 Clematis 480 EC
- 41 Baldron 400 SL

42-44 Insektycydy

- 42 Grot 18 EC
- 44 Xapiro 05 SC

45-46 Zaprawy nasienne

- 45 Proseed 050 FS
- 46 Fludio Żel 025 FS

47-50 Nawozy

- 47 Kuporsal 25
- 49 Kuporsal 50

51-52 Adiuwanty

- 51 Hydron
- 52 Oleo 84 EC

Podane informacje są zgodne ze stanem rejestracji na dzień wydania katalogu i mogą się zmienić w trakcie sezonu.

MIEDZIAN[®]

50 WP



jabłoń



grusza



siewki i sadzonki
modrzewia oraz
leśnych gatunków
liściastych



warzywa
i owoce



uprawy
małoobszarowe
drzew owocowych
i orzechów



wiśnia,
czereśnia



Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym



Dedykowany do wczesnowiosennych zabiegów przeciwko parchowi jabłoni i gruszy



Ogranicza ryzyko selekcji form odpornych patogenów



Niezawodny w ochronie przed groźnymi chorobami grzybowymi i bakteryjnymi



Opakowania 3 kg oraz 45 kg zawierają produkt w woreczkach wodorozpuszczalnych

Dostępne opakowania:

250 g, 500 g, 1,5 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 45 kg

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
jabłoń	parch jabłoni	1,5 kg/ha	Stosować w fazie zielonego pąka (BBCH 00-07). Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.

MIEDZIAN[®]

50 WP



Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
jabłoń	zaraza ogniowa	1,5 kg/ha	Pierwszy zabieg wykonać w fazie kwitnienia (BBCH 60-69), drugi na początku fazy wzrostu owoców (BBCH 71) - owoc osiąga wielkość do 10 mm. Środek stosować głównie w sadach, w których choroba wystąpiła w poprzednich sezonach i w sadach w pobliżu ognisk choroby. Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
grusza	parch gruszy	1,5 kg/ha	Stosować w fazie rozwoju pąka (BBCH 00-07). Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Liczba zabiegów w sezonie: 2. Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
	zaraza ogniowa	1,5 kg/ha 0,75 kg/ha	Zastosowanie w fazie kwitnienia (BBCH 60-69) – liczba zabiegów: 1 (dawka: 1,5 kg/ha). Zastosowanie na początku fazy wzrostu owoców do 10 mm (BBCH 71) – liczba zabiegów: 1 (dawka: 0,75 kg/ha). Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
czereśnia, wiśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych	1,5-3 kg/ha	Stosowanie od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51-61) - liczba zabiegów: 1, niższą dawkę stosować od fazy pełni kwitnienia (BBCH 65-73) - liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwiń	3 kg/ha	Stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków (BBCH 00-03) lub jesienią. Stosować 1 raz w sezonie.



MIEDZIAN[®]

50 WP

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
ogórek w uprawie polowej oraz szklarniowej i pod osłonami	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych	w gruncie: 2,5 kg/ha	W gruncie: stosować w fazie gdy na pędzie głównym jest otwarty 2 kwiat do fazy, gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62-78), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni.
		pod osłoną: 0,16% 0,16 kg środka w 100 litrach wody	Pod osłoną: Stosowanie od fazy kiedy liście są całkowicie rozwinięte do fazy pełnej dojrzałości, kiedy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 10-89). Wykonać 2-4 zabiegi w odstępach co 7 dni.
pomidor w uprawie polowej oraz szklarniowej i pod osłonami	zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowość pomidora	w gruncie: 2-2,5 kg/ha	W gruncie: stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy w której 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 51-85), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni.
		pod osłoną: 0,25% 0,25 kg środka w 100 litrach wody	Pod osłoną: stosować od fazy widocznego szóstego kwiatostanu do fazy, w której 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 56-88), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni.
fasola szparagowa	antraknoza fasoli, bakterioza obwódki fasoli, szara pleśń	3 kg/ha	Stosować od pełni fazy kwitnienia do końca kwitnienia (BBCH 65-69). Maksymalnie 2 zabiegi co 7 dni.

MIEDZIAN[®]

50 WP



Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna	parch gruszy	0,9-1,5 kg/ha	Stosowanie: zapobiegawczo w fazie rozwoju pąka. Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów (BBCH 00-07). Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
	zaraza ogniowa	1,5 kg/ha	Stosowanie: środek zastosować w fazie kwitnienia (BBCH 60-69) - liczba zabiegów: 1 oraz na początku fazy wzrostu owoców (BBCH 71) - owoc osiąga wielkość do 10 mm - liczba zabiegów: 1. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
czarna porzeczka	antraknoza liści porzeczek, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści porzeczek	2,4 kg/ha	Stosować zapobiegawczo od fazy grona, kiedy wszystkie pąki kwiatowe są oddzielone aż do pełni fazy kwitnienia, przynajmniej 50% kwiatów rozwiniętych, opadają pierwsze płatki (BBCH 59-65). Maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 10 dni.
orzech włoski, leszczyna pospolita	antraknoza orzecha włoskiego, bakteryjna zgorzel orzecha włoskiego, bakteryjna zgorzel leszczyny	2-3 kg/ha	Stosować zapobiegawczo, od momentu pęknięcia pąków przed kwitnieniem kwiatów żeńskich (BBCH 60). Liczba zabiegów: 1.
morela, śliwa	rak bakteryjny drzew pestkowych	3 kg/ha	Stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy początku kwitnienia- otwartych około 10% kwiatów (BBCH 51-61). Liczba zabiegów: 1.



MIEDZIAN[®]

50 WP

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
bakłażan w uprawie polowej oraz szklarniowej i pod osłonami	bakteryjna cętkowość pomidora, zaraza ziemniaka	w gruncie: 2,5 kg/ha	W gruncie: stosować od początku rozwoju kwiatostanu do fazy, w której 50% owoców uzyska typową barwę (BBCH 56-85), 2-3 razy w sezonie, co 7-10 dni.
		pod osłoną: 0,25% 0,25 kg środka w 100 litrach wody	Pod osłoną: stosować od fazy widocznego 6 kwiatostanu do fazy, w której 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 56-88), 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni.
cukinia w uprawie polowej	bakteryjna kanciasta plamistość ogórka, mączniak rzekomy dyniowatych	2,5 kg/ha	Stosować od fazy, gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62-78). Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni.
melon, dynia zwyczajna, arbuz w uprawie szklarniowej i pod osłonami	bakteryjna kanciasta plamistość ogórka, mączniak rzekomy dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	0,25% 0,25 kg środka w 100 litrach wody	Stosować od faz, gdy liście są całkowicie rozwinięte do fazy pełnej dojrzałości, kiedy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 10-89). Wykonać 2-3 zabiegi, w odstępach co 7 dni.
fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy w uprawie polowej	bakterioza obwódkowa fasoli, antraknoza fasoli, szara pleśń	3 kg/ha	Stosować zapobiegawczo, od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło, widoczne pierwsze strąki)(BBCH 65-69), wykonując zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobą bakteryjną. Liczba zabiegów: 2

**Substancja
aktywna:**
tlenochlorek miedzi
- 500 g/kg

A decorative graphic in the top right corner featuring a blue hexagon and several green lines of varying lengths and orientations, creating a modern, abstract design.

MIEDZIAN[®]EXTRA

350 SC



jabłoń



grusza



warzywa
i owoce



uprawy
małoobszarowe
drzew owocowych
i orzechów



wiśnia,
czereśnia



- » Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
- » Dedykowany do wczesnowiosennych zabiegów przeciwko parchowi jabłoni i gruszy
- » Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny o wysokim stopniu rozdrobnienia cząstek
- » Niezawodny w ochronie przed groźnymi chorobami grzybowymi i bakteryjnymi
- » Zawiera adiuwanty zwiększające przyczepność i skuteczność biologiczną substancji aktywnej

Dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
jabłoń	parch jabłoni	1,5 l/ha	Stosować w fazie zielonego pąka (BBCH 00-07). Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Odstęp między zabiegami: 7 - 10 dni. Liczba zabiegów: 2.

MIEDZIAN[®]EXTRA

350 SC



Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
grusza	parch gruszy	1,5 l/ha	Stosować w fazie zielonego pąka (BBCH 00-07). Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Liczba zabiegów w sezonie: 2. Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
	zaraza ogniowa	1,5 l/ha; 0,75 l/ha	Zastosowanie w fazie kwitnienia (BBCH 60-69) – liczba zabiegów: 1 (dawka: 1,5 l/ha). Zastosowanie na początku fazy wzrostu owoców (BBCH 71) – liczba zabiegów: 1 (dawka: 0,75 l/ha). Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
czereśnia, wiśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych	1,5-3 l/ha	Stosować w okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51) – liczba zabiegów (dawka: 3 l/ha): 1. Stosować w okresie kwitnienia (BBCH 60) – liczba zabiegów (dawka 1,5l/ha): 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwiń	3 l/ha	Stosować w okresie bezlistnym, w czasie nabrzmiewania pąków lub jesienią (BBCH 00-03). Stosować 1 raz w sezonie.
ogórek w uprawie polowej oraz szklarniowej i pod osłonami	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych	w gruncie: 2–2,5 l/ha	W gruncie: stosować od fazy, gdy na pędzie głównym jest otwarty 2 kwiat do fazy, gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62-78), stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni.



MIEDZIAN[®]EXTRA

350 SC

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
ogórek w uprawie polowej oraz szklarniowej i pod osłonami	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych	pod osłoną: 0,23% 230 ml środka w 100 litrach wody	Pod osłoną: od fazy kiedy liście są całkowicie rozwinięte do fazy pełnej dojrzałości, kiedy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 10-89), stosować 2-4 zabiegi w sezonie, co 7 dni.
pomidor w uprawie polowej oraz szklarniowej i pod osłonami	zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowość pomidora	w gruncie: 2-2,5 l/ha	W gruncie: stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy w której 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 51-85), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni.
		pod osłoną: 0,36% 360 ml środka w 100 litrach wody	Pod osłoną: stosować od fazy widocznego szóstego kwiatostanu do fazy, w której 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 56-88), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni.
fasola szparagowa	antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń	2-2,5 l/ha	Stosować zapobiegawczo, od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło: widoczne pierwsze strąki, BBCH 65-69), wykonując 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni.
pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna	parch gruszy	0,9-1,5 l/ha	Stosować zapobiegawczo w fazie rozwoju pąka. Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów (BBCH 00-07). Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

MIEDZIAN[®] EXTRA

350 SC



Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna	zaraza ogniowa	1,5 l/ha; 0,75 l/ha	Stosować w fazie kwitnienia (BBCH 60-69) – liczba zabiegów (dawka: 1,5 l/ha): 1. Stosować na początku fazy wzrostu owoców – owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71) - liczba zabiegów (dawka: 0,75 l/ha) : 1. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
czarna porzeczka	antraknoza liści porzeczek, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści porzeczek	3 l/ha	Stosować zapobiegawczo od fazy grona, kiedy wszystkie pąki kwiatowe są oddzielone, aż do pełni fazy kwitnienia, przynajmniej 50% kwiatów rozwiniętych, opadają pierwsze płatki (BBCH 59-65). Maksymalnie 2 razy w sezonie, co najmniej 10 dni.
orzech włoski, leszczyna pospolita	antraknoza bakteryjna, zgorzel	2–3 l/ha	Stosować zapobiegawczo, od momentu pęknięcia pąków przed kwitnieniem kwiatów żeńskich (BBCH 60). Liczba zabiegów: 1.
morela, śliwa	rak bakteryjny drzew pestkowych	3 l/ha; 1,5 l/ha	Stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51) – liczba zabiegów (dawka: 3 l/ha): 1. Stosować na początku fazy kwitnienia (BBCH 60) – liczba zabiegów (dawka: 1,5 l/ha): 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
bakłażan w uprawie polowej oraz szklarniowej i pod osłonami	bakteryjna cętkowość pomidora, zaraza ziemniaka	w gruncie: 2,5 l/ha	W gruncie stosować od początku rozwoju kwiatostanu do fazy, w której 50% owoców uzyska typową barwę (BBCH 51-85), 2-3 razy w sezonie, co 7-10 dni.



MIEDZIAN[®]EXTRA

350 SC

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
bakłażan w uprawie polowej oraz szklarniowej i pod osłonami	bakteryjna cętkowość pomidora, zaraza ziemniaka	pod osłoną: 0,36% 360 ml środka w 100 litrach wody	Pod osłoną stosować od fazy widocznego 6 kwiatostanu do fazy, w której 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 56-88), Maksymalnie 2-3 razy w sezonie, co 7-10 dni.
cukinia w uprawie polowej	bakteryjna kanciasta plamistość ogórka, mączniak rzekomy dyniowatych	2,5 l/ha	Stosować od fazy, gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62-78). Maksymalnie 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni.
melon, dynia zwyczajna, arbuz w uprawie szklarniowej i pod osłonami	bbakteryjna kanciasta plamistość ogórka, mączniak rzekomy dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	0,36% 360 ml środka w 100 litrach wody)	Stosować od faz, gdy liście są całkowicie rozwinięte do fazy pełnej dojrzałości, kiedy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 10-89). Maksymalnie 2-3 zabiegi, w odstępach co 7 dni.
fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy w uprawie polowej	bakterioza obwódkowa fasoli, antraknoza fasoli, szara pleśń	2,5 l/ha	Stosować od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło, widoczne pierwsze strąki) (BBCH 65-69) wykonując 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobą bakteryjną.

KAPTAN®

ZAWIESINOWY 50 WP



jabłoń



grusza



drzewa, krzewy
oraz roczne
rośliny ozdobne



fasola
szparagowa



wiśnia



Niezawodny w ochronie sadów przed parchem jabłoni i gruszy



Zapewnia skuteczną ochronę wiśni przed gorzką zgnilizną



Korzystnie wpływa na wybarwianie owoców oraz tzw. efekt zielony



Najkrótszy okres karencji dla wiśni - 14 dni



Do stosowania przez cały sezon wegetacyjny

Dostępne opakowania:

1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg



Sprzedawany w woreczkach wodorozpuszczalnych

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
jabłoń, grusza	parch jabłoni, parch gruszy	3 kg/ha	Stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka kwiatowego (pojedyncze kwiaty oddzielają się, są ciągle zamknięte) do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 56-59) oraz od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71-75). Stosować maksymalnie 4 razy w sezonie, co minimum 7 dni.



KAPTAN®

ZAWIESINOWY 50 WP

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni	3 kg/ha	Środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych od fazy rozrastania się załężni do początku dojrzewania, wybarwiania owoców (BBCH 72 – 81). Stosować maksymalnie 4 razy w sezonie, co 10-14 dni. Stosowanie co minimum 10-14 dni.
fasola szparagowa	antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa, szara pleśń	1,2 kg/ha	Środek stosować w okresie formowania strąków (BBCH 69-71). Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co 7-10 dni. Stosowanie co minimum 7-10 dni.
drzewa i krzewy ozdobne (uprawiane w szklarniach trwałych)	parch, plamistość liści	0,24% (0,24 kg/100 l wody)	Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, w odstępie co najmniej 10 dni.
roczne rośliny ozdobne (uprawiane w szklarniach trwałych)	szara pleśń	0,19% (0,19 kg/100 l wody)	Stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, w odstępie co najmniej 10 dni.

KAPDUO®

ReNovo 72,5 WG



jabłoń



grusza



pigwa



nieszpułka



wiśnia,
czereśnia

**Substancja
aktywna:**

difenokonazol 25 g/kg
kaptan - 700 g/kg



Sprawdzona mieszanina 2 kompatybilnych substancji aktywnych: kaptan i difenokonazol, działających powierzchniowo i układowo

Szerokie zastosowanie w uprawach: jabłoń, grusza, nieszpułka, pigwa, wiśnia, czereśnia

Jedyny środek zarejestrowany w Polsce zawierający połączenie difenokonazolu i kaptanu

Bardzo wysoka jednorodność cieczy użytkowej zapewnia precyzyjną aplikację na roślinie

Działa prewencyjnie i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji

Dostępne opakowania: 1 kg, 10 kg

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
jabłoń	parch jabłoni	2 kg/ha	Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka (pojedyncze kwiaty oddzielają się, są ciągle zamknięte) do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 56-59) oraz od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do końca fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71-75). Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co minimum 5 dni.



KAPDUO[®]

ReNovo 72,5 WG

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
jabłoń	mączniak jabłoni	2 kg/ha	Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się – faza T (BBCH 71-74).). Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co minimum 10 dni.
grusza, pigwa	parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych	2 kg/ha	Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka (pojedyncze kwiaty oddzielają się, są ciągle zamknięte) do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 56-59) oraz od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania owoców (wybarwianie się owocu na typowy dla danego gatunku (odmiany) kolor) (BBCH 71-81). Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co minimum 10 dni.
nieszpułka	parch, mączniak prawdziwy	2 kg/ha	Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka, (pojedyncze kwiaty oddzielają się, są ciągle zamknięte) do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 56-59) oraz od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-81). Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co minimum 10 dni.

KAPDUO®

ReNovo 72,5 WG



Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
wiśnia, czereśnia	drobna plamistość liści drzew pestkowych	2 kg/ha	Stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju zalążni, gdy po przekwitnięciu powstaje owoc do fazy, gdy owoc osiąga około 60% typowej wielkości (BBCH 71-76). Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co minimum 10-14 dni.
	gorzka zgnilizna		Stosować zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju zalążni, gdy po przekwitnięciu powstaje owoc do początku fazy dojrzewania owoców (wybarwianie owoców) (BBCH 71-81). Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co minimum 10-14 dni.
	brunatna zgnilizna drzew pestkowych		Stosować zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju zalążni, gdy po przekwitnięciu powstaje owoc do fazy rozrastania zalążni (BBCH 71-72). Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co minimum 5-10 dni.

TORES[®]

250 EC



jabłoń



grusza



róża



warzywa



pszenica ozima
i pszenżyto ozime



rzepak
ozimy



wiśnia,
czereśnia



Skuteczna ochrona przed parchem jabłoni i gruszy od początku fazy różowego/białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągną wielkość do 20 mm



Ochrona wiśni oraz czereśni przed drobną plamistością drzew pestkowych



Rozszerzona rejestracja o szereg upraw rolniczych, a także małoobszarowych sadowniczych i warzywnych



Badania pozostałości dla środka Tores 250EC wskazują, że poziom pozostałości difenokonazolu w roślinach jest niższy niż ustalony na poziomie UE najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości



Wysoka skuteczności działania w ziemniaku na oba patogeny alternarii (*Alternaria alternata* oraz *solani*)

Dostępne opakowania:

250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l


Dostępne marki:

VALOR[®] 250 EC, WEZEN 250 EC, FERTEN 250 EC, BLUNA 250 EC, HAJMON 250 EC


Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
jabłoń	parch jabłoni	0,2 l/ha	Stosować zapobiegawczo co 10-14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągną wielkość do 20 mm (BBCH 57-72). Maksymalnie 3 zabiegi w sezonie, co 10 minimum dni.

TORES®

250 EC



Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
wiśnia, czereśnia	drobna plamistość liści drzew pestkowych	0,2 l/ha	Stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy, gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości BBCH (71-78). Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 14 dni.
grusza	parch gruszy	0,2 l/ha	Stosować zapobiegawczo co 10-14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72). Maksymalnie 3 zabiegi w sezonie, co minimum 10 dni.
rzepak ozimy	czereń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa	0,5 l/ha	Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65). Maksymalnie 1 zabieg w sezonie.
pszenica ozima	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności)	0,5 l/ha	Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 3 kolanka do pełni fazy kłoszenia (odstania się 50% kwiatostanu) (BBCH 33-55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od fazy, gdy odstania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odstania się 50% kwiatostanu) (BBCH 53-55).



TORES®

250 EC

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
pszenżyto ozime	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności)	0,5 l/ha	Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 3. Kolanka do pełni fazy kłoszenia (odstania się 50% kwiatostanu) (BBCH 33-55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od fazy, gdy odstania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odstania się 50% kwiatostanu) (BBCH 53-55).
ziemniak	alternarioza ziemniaka (średni poziom skuteczności)	0,3 l/ha	Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy widoczne są pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 51-91). Maksymalnie 4 zabiegi w sezonie, co minimum 10 dni.
burak cukrowy	chwościk buraka	0,32 - 0,4 l/ha	Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy początku zakrywania międzyrzędzi (liście zakrywają 10% powierzchni gleby) do fazy ,gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 31-49). Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, co 14 dni.
marchew, rzodkiew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan	alternarioza, mącznik prawdziwy	0,5 l/ha	Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89). Maksymalnie 3 zabiegi w sezonie, co minimum 14 dni.

Uprawa	Choroby	Dawka	Termin stosowania
topinambur	zgnilizna twardzikowa	0,5 l/ha	Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 -89). Maksymalnie 3 zabiegi w sezonie, co minimum 14 dni.
salsefia	mączniak prawdziwy	0,5 l/ha	Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 -89). Maksymalnie 3 zabiegi w sezonie, co minimum 14 dni.
rzepa, brukiew	alternarioza	0,5 l/ha	Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 -89). Maksymalnie 3 zabiegi w sezonie, co minimum 14 dni.
burak ćwikłowy	rdza buraka	0,5 l/ha	Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 -89). Maksymalnie 3 zabiegi w sezonie, co minimum 14 dni.
róża uprawiana w polu	mączniak prawdziwy, rdza	0,5 l/ha	Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, co minimum 14 dni.

NOWOŚĆ

MEZOFLOR[®]

103 SC



kukurydza

**Substancja
aktywna:**

mezotrión - 100 g/l
florasulam - 3 g/l



2 substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania - hamują wzrost i rozwój chwastów

Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie kukurydzy

Długi termin stosowania po wschodach rośliny uprawnej, od 2 do 8 liści kukurydzy

Efekt widoczny już po 5-7 dniach od zabiegu
Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Dostępne marki: Floccorn 103 SC

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
kukurydza	chwasty wrażliwe: rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobotki polne, żółtlica drobnokwiatowa chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna (nadmorska), przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku chwasty odporne: chwastnica jednostronna	1 l/ha	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

MEZOFLOR[®]


103 SC

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
kukurydza	chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna (nadmorska), przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żóltlica drobnokwiatowa chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku	1,25 l/ha	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ekspert radzi:

- możliwość elastycznego doboru dawki dopasowanej do występującego zachwaszczenia,
- możliwość stosowania z innymi herbicydami jako komponent pełnej technologii (doskonały partner dla terbutylazyny oraz nikosulfuronu),
 - produkt może być stosowany co roku,
- w formulacji zastosowano adiuwanty podnoszące skuteczność biologiczną produktu i stabilność substancji aktywnych podczas przechowywania.

NOWOŚĆ



DONNA CORNLEONE

substancje aktywne:

terbutylazyna • mezotrion • nikosulfuron • florasulam

SKUTECZNIE ELIMINUJE WSZYSTKIE CHWASTY W KUKURYDZY



Aż 4 substancje aktywne z 4 różnych grup chemicznych - trafiona strategia antyodpornościowa

Pełne dawki rejestracyjne

Ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu

Długi termin stosowania po wschodach rośliny uprawnej, od 2 do 8 liści kukurydzy

Donna Cornleone pak na 1 ha
Donna Cornleone pak na 5 ha


PAK ZAWIERA 3 PRODUKTY



TAZOPRYM

500 SC


- >> Niezawodny w zwalczaniu chwastów dwuliściennych w kukurydzy
- >> Idealny partner do tworzenia mieszanin zbiornikowych
- >> Działając przez 6-8 tygodni po zabiegu skutecznie ogranicza ryzyko wtórnego zachwaszczenia
- >> Możliwość stosowania zarówno dogłębowo, jak i nalistnie



FLOCORN

103 SC


- >> Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie kukurydzy
- >> 2 substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania - hamują wzrost i rozwój chwastów
- >> Długi termin stosowania po wschodach rośliny uprawnej, od 2 do 8 liści kukurydzy
- >> Efekt widoczny już po 5-7 dniach od zabiegu
Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach



MENTUM

040 OD

- >> Hamuje wzrost i rozwój chwastów szczególnie młodych i intensywnie rosnących
- >> Płynna formuła zwiększa efektywność i wygodę stosowania
- >> Bezpieczny dla upraw – brak fitotoksyczności oraz wpływu na jakość i wielkość plonu
- >> Pierwsze objawy działania produktu są widoczne już po 4-5 dniach, chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu



ORKAN

350 SL



jabłoń



czereśnia
wiśnia

**Substancja
aktywna:**

MCPA 90 g/l
Glifosat 260 g/l



**INTEGROWANA
PRODUKCJA**



Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chwastów
jedno- i dwuliściennych



Skutecznie zwalcza chwasty szczególnie uciążliwe
- wieloletnie i głęboko korzeniące się (m.in. perz,
skrzyp, wierzbowica gruczołowata)



Szybko widoczny efekt działania środka - pierwsze
rezultaty są obserwowane po ok. 7-14 dniach



Istotny element strategii antyodpornościowej



Zawartość biodegradowalnego adiuwantu,
który sprzyja efektywności zwilżania i zapewnia
zwiększoną skuteczność zabiegu

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
jabłoń, wiśnia, czereśnia	chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna	5 l/ha	Stosować na wiosnę w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
jabłoń, wiśnia, czereśnia	chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, śláz zaniedbany, wierzbowica gruczołowata	7 l/ha	Stosować na wiosnę w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

TAZOPRYM

500 SC



kukurydza



**Substancja
aktywna:**

terbutylazyna - 500 g/l



**INTEGROWANA
PRODUKCJA**



Niezawodny w zwalczaniu chwastów dwuliściennych w kukurydzy



Idealny partner do tworzenia mieszanin zbiornikowych



Skutecznie chroni przed wschodami chwastów (6-8 tygodni)



Stosowanie zarówno dogłobowo, jak i nalistnie

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Dostępne marki: TERBUT® 500 SC, CORNAO 500 SC

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
kukurydza	chwasty wrażliwe: fiołek polny, maruna nadmorska, szarłat szorstki, tasznik pospolity chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdestówka powojowata	Tazoprym 500 SC 1 l/ha + Hydron 0,2 l/ha	Środek stosować przedwschodowo w fazie suchego ziarniaka (BBCH 00). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna nadmorska, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, rumianek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek	Tazoprym 500 SC 1 l/ha + Hydron 0,2 l/ha	Środek stosować powschodowo od fazy 2 do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

TAZOPRYM

500 SC

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
kukurydza	chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, maruna nadmorska, przytulia czepna, przetacznik polny, psianka czarna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita	1 l/ha	Środek stosować powschodowo od fazy 2 do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

PREMIER®

300 SL



zboża jare
i ozime



Substancja
aktywna:

MCPA - 300 g/l



INTEGROWANA
PRODUKCJA

Pierwsze objawy widoczne są na młodych częściach rośliny, można je zaobserwować od kilku godzin do 2 dni po zabiegu

MCPA niezawodne w walce z chwastami dwuliściennymi w fazie krzewienia zbóż

Bezpieczny dla roślin następczych i przesiewów

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

Dostępne marki: LIDER 300 SL

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
zboża jare (pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies)	chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, poziomnik szorstki chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, rumian polny chwasty odporne: przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty)	3 l/ha	Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
zboża ozime (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto)	chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek chwasty średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rumian polny, gwiazdnica pospolita chwasty odporne: przytulia czepna	3 l/ha	Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

PREMIER®

750 SL



zboża jare
i ozime



Substancja
aktywna:

MCPA - 750 g/l

INTEGROWANA
PRODUKCJA

Pierwsze efekty działania produktu są widoczne już na drugi dzień po zastosowaniu

Temperatura minimalna dla MCPA wynosi 8-12°C, temperatura optymalna: 20°C, maksymalna do 25°C

Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

Dostępne marki: LIDER 750 SL

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
zboża jare (pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies)	chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, poziomnik szorstki chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, rumian polny chwasty odporne: przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty)	0,75 l/ha	Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
zboża ozime (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto)	chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek chwasty średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rumian polny chwasty odporne: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna	1 l/ha	Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

PREMIER®D

750 SL



zboża jare
i ozime



**Substancja
aktywna:**

MCPA - 750 g/l
dikamba - 90 g/l



**INTEGROWANA
PRODUKCJA**

» Zwalcza skutecznie chwasty dwuliścienne
w wielu uprawach

» Wizualny efekt skuteczności widoczny już kolejnego
dnia po zastosowaniu

» Produkt jest pobierany przez liście chwastów
powodując ich deformację, a następnie zahamowanie
wzrostu oraz zamieranie roślin

» Wysoka koncentracja substancji MCPA i dikamba
umożliwia stosowanie niskiej dawki na hektar

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

Dostępne marki: LIDER D 750 SL

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
zboża jare (pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies)	chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiolka polna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rumian polny, samosiwy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: rdestówka powojowata (rdest powojowaty)	1 l/ha	Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiolka polna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, samosiwy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	1,25 l/ha	

PREMIER® D

750 SL

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
zboża ozime (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto)	chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik perski	1 l/ha	Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik perski	1,25 l/ha	
Istotny element strategii antyodpornościowej.			

HEXYPYR

200 EC



zboża jare
i ozime




- » Blokuje równowagę hormonalną i wzrost chwastów
- » Nie powoduje uodparniania się chwastów
- » Bezpieczny dla roślin uprawnych – wykazuje całkowitą selektywność do gatunków roślin jednoliściennych
- » Skuteczny w zwalczaniu przytuli czepnej w każdej fazie rozwoju
- » Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

Dostępne marki: DICOLEN 200 EC, TIRON 200 EC

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
żyto ozime, pszenica ozima, pszenżyto ozime	chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziomnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna chwasty odporne: przetacznik perski, samosiewy rzepaku	0,6 l/ha	Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH 32). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziomnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku	1 l/ha	



HEXYPYR

200 EC

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
Trawniki	chwasty wrażliwe: stokrotka pospolita chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, brodawnik jesienny, jastrzębiec kosmaczek, mniszek pospolity, rdest ptasi, szczaw polny, szczaw zwyczajny chwasty średnioodporne: konieczyna biała, krwawnik pospolity	1,9 l/ha	Środek stosować od kwietnia do września. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

*Stosowanie marek:

HEXYPYR 200 EC: chwasty w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, trawnikach

DICOLEN 200 EC: chwasty w jęczmieniu jarym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, trawnikach

TIRON 200 EC: chwasty w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym

MENTUM

040 OD



kukurydza



**Substancja
aktywna:**

nikosulfuron - 40 g/l



**INTEGROWANA
PRODUKCJA**

Hamuje wzrost i rozwój chwastów szczególnie młodych i intensywnie rosnących

Płynna formułacja zwiększa efektywność i wygodę stosowania

Bezpieczny dla upraw – brak fitotoksyczności oraz wpływu na jakość i wielkość plonu

Pierwsze objawy działania produktu są widoczne już po 4-5 dniach, chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu

Dzięki formułacji OD krople cieczy roboczej szybko przedostają się przez warstwę woskową liścia do jego wnętrza i preparat jest rozprowadzany wewnątrz całej rośliny

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

Dostępne marki: TAMIZAN 040 OD, VENTTO 040 OD

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
kukurydza	chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, rdestówka powojowata	1 l/ha	Środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-ego do końca fazy 7-ego liścia właściwego (BBCH 12-17). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

Najwyższą efektywność w zwalczaniu chwastów można uzyskać stosując środek w czasie ciepłej i wilgotnej pogody.

HADAR

360 CS



rzepak ozimy



**Substancja
aktywna:**

chlomazon - 360g/l



**INTEGROWANA
PRODUKCJA**



Minimalizuje wystąpienie zachwaszczenia wtórnego



Całkowite zamieranie chwastów już po 5-7 dniach po wschodach



Zmniejszenie ryzyka fitotoksyczności dzięki bezpiecznej dla roślin formulacji CS



Rekomendowany do łącznego stosowania ze środkiem Effendi 500 SC

Dostępne opakowania: 500 ml, 1 l, 5 l

Dostępne marki: MARQIS 360 CS

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
rzepak ozimy	chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik rolny, przytulia czepna chwasty średniowrażliwe: komosa biała, tobołki polne chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlec obrotny	0,25 l/ha	Środek po siewie rzepaku (najpóźniej 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) ziemię. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik rolny, przytulia czepna, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: komosa biała chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlec obrotny	0,33 l/ha	Środek po siewie rzepaku (najpóźniej 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) ziemię. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

EFFENDI

500 SC



rzepak ozimy



**Substancja
aktywna:**

metazachlor - 500 g/l



**INTEGROWANA
PRODUKCJA**



Doskonale zwalcza wiele najważniejszych
jedorocznych chwastów dwuliściennych



Środek jest pobierany przez korzenie kietkujących
chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również
na chwasty po ich wschodach do fazy wykształcenia
pierwszej pary liści



Wykazuje pełną selektywność względem roślin
uprawnych



Rekomendowany do łącznego stosowania ze środkiem
Hadar 360 CS/Marqis 360 CS

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Dostępne marki: METKAN 500 SC, HIPERKAN 500 SC

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
rzepak ozimy	chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, maruna nadmorska, przytulia czepna, tasznik pospolity chwasty średniowrażliwe: fiołek polny	Effendi 500 SC 1,5 l/ha + Hadar 360 CS /Marqis 360 CS 0,25 l/ha	Stosować jesienią, bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rzepaku (BBCH 00-05). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, maruna nadmorska chwasty średniowrażliwe: przytulina czepna, samosiewy zbóż, tasznik pospolity chwasty odporne: fiołek polny	2 l/ha	Stosować jesienią, po wschodach gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12), a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.

FLUTAX

150 EC



rzepak ozimy



burak cukrowy



uprawy
małoobszarowe



kapusta
głowiasta biała



Zwalcza szerokie spektrum uciążliwych chwastów jednoliściennych (jednorocznych i wieloletnich)



Wysoka selektywność dla roślin uprawnych



Zamieranie chwastów widoczne po 2-3 tygodniach od zabiegu



Środek jest pobierany przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju


Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Dostępne marki: ESORIO 150 EC, GRASTOP 150 EC

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
rzepak ozimy	samosiewy zbóż	Flutax 150 EC w 0,5l/ha + Oleo 84 EC 1,5l/ha	Środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	perz właściwy (w fazie 4-6 liści)	Flutax 150 EC w 0,5l/ha + Oleo 84 EC 1,5l/ha	
	miotła zbożowa	Esorio 150 EC 0,75l/ha + Oleo 84 EC 1,5 l/ha	

FLUTAX

150 EC



Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
rzepak ozimy, rzepak jary, len zwyczajny, słonecznik zwyczajny, mak lekarski, gorczyca	samosiewy zbóż	0,75 l/ha	Środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	perz właściwy (w fazie 4-6 liści)	2,0 l/ha	
	miotła zbożowa	1,0 l/ha	
burak cukrowy	samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna	1,0 l/ha	Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12-18). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
kapusta głowiasta biała	samosiewy zbóż, perz właściwy	2,5 l/ha	Środek stosować po przyjęciu się rozsady od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12- 14). Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.
bobik, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, fasola szparagowa, groch zielony (uprawiany na strąki), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona, groch zwyczajny pastewny uprawiany na suche nasiona, łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, seradela pastewna, soja, wyka kosmata, wyka siewna	-	2,5 l/ha	Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji i nie później niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 13-50). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka.

CLEMATIS

480 EC



rzepak
ozimy



Substancja
aktywna:

chlomazon - 480 g/l

Wysoka skuteczność w zwalczaniu przytuli czepnej i innych gatunków chwastów dwuliściennych

Możliwość stosowania pojedynczo oraz w mieszaninie zbiornikowej z Effendi 500 SC

Działa na chwasty w okresie kietkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Uprawa	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
rzepak ozimy	chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: przetacznik polny chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtnica drobnokwiatowa	0,2 l/ha	Środek stosować bezpiecznie po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przetrzymywania. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik polny chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtnica drobnokwiatowa	0,25 l/ha	

Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.

BALDRON

400 SL



kostka brukowa,
torowiska kolejowe
i inne

**Substancja
aktywna:**

2,4-D - 160 g/l
glifosat - 240 g/l



Produkt działający totalnie - zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne (jednoroczne i wieloletnie)



Pierwsze efekty działania środka widoczne już po kilku dniach



Zawiera dwie substancje aktywne o odmiennym mechanizmie działania



2,4-D powoduje zahamowanie wzrostu i karłowacenie roślin, a glifosat obumieranie ich korzeni oraz części nadziemnych



Zawiera dwa adiuwanty, które wspomagają rozpraszanie cieczy roboczej, efektywne zwilżenie, a w konsekwencji szybkie wchłonięcie w roślinę substancji aktywnej

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

Miejsce stosowania	Chwasty	Dawka	Termin stosowania
kostka brukowa, place magazynowe, tereny przemysłowe, jak również inne stałe konstrukcje o twardych półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie torowiska kolejowe	chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wiechlina roczna	3 l/ha	Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych, przez cały okres wegetacji chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
	chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bylica pospolita, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, rdest ptasi, starzec zwyczajny, stokłosy, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona. chwasty średniowrażliwe: pokrzywa zwyczajna	5 l/ha	

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

GROT

18 EC



ogórek



ogórek



pomidor



papryka



truskawka



chryzantema,
róża i gerbera



Skutecznie zwalcza przędziorki, wciornastki i miniarki w uprawach szklarniowych: warzywnych, ozdobnych oraz małoobszarowych



Po jego zastosowaniu szkodniki przestają żerować w ciągu kilku godzin



Długotrwałe działanie ze względu na bezpośrednie wnikiwanie do wnętrza liścia (w ciągu 6-8 h)



Brak uodporniania się szkodników na substancję aktywną abamektyna




Abamektyna stanowi naturalny produkt fermentacji prowadzonej przez mikroorganizmy glebowe *Streptomyces avermitilis*

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Uprawa	Szkodniki	Dawka	Termin stosowania
ogórek, papryka, pomidor	przędziorek chmielowiec	0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 7 dni.
chryzantema	przędziorek chmielowiec, wciornastek zachodni	0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 7 dni.

GROT

18 EC



Uprawa	Szkodniki	Dawka	Termin stosowania
róża	przędziorek chmielowiec	0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 7 dni.
gerbera	miniarki	0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co minimum 7 dni.
truskawka	przędziorek chmielowiec	1,2 l/ha	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99). Stosować raz w sezonie.

Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Rekomendacja Eksperta ŚOR

Oprysk najlepiej wykonać wczesnym wieczorem lub w nocy, aby substancja aktywna nie była narażona na działanie promieniowania UV.

XAPIRO

05 SC



jabłoń



**Substancja
aktywna:**

fenpiroksymat - 50 g/l



**INTEGROWANA
PRODUKCJA**

» Zawiera fenpiroksymat - substancję skuteczną w zwalczaniu larw i form dorosłych przędziorków

» Nie wpływa negatywnie na organizmy pożyteczne ani chronione drzewa

» Chroni przed następstwami żerowania szkodników (np. ordzawienia owoców, opadanie i deformacja liści)

» Dla profesjonalnych sadowników ceniących sobie wysoką skuteczność

Dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l, 5 l

Dostępne marki: PIROX 05 SC

Uprawa	Szkodniki	Dawka	Termin stosowania
jabłoń	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec	1-1,5 l/ha	Stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, w okresie od fazy kiedy owoc osiągnie wielkość do 20 mm do fazy kiedy owoc osiągnie połowę typowej wielkości (BBCH 72-75).

PROSEED®

050 FS



zboża jare
i ozime



Substancja aktywna:

fludioksonil - 25 g/l
difenokonazol - 25 g/l



INTEGROWANA
PRODUKCJA

Cechuje się łatwością w użyciu, równomiernością pokrycia ziarna i znakomitą przyczepnością do jego powierzchni

Zwalcza choroby grzybowe, w tym pleśń śniegową, śnieć cuchnącą i zgorzel siewek

Zawiera substancje aktywne o różnych mechanizmach działania, co zwiększa efektywność ochrony i obniża ryzyko powstania form odpornych zwalczanych patogenów

Zawiera naturalny adiuwant, który jest produkowany z surowców pochodzenia naturalnego

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Dostępne marki: DIFLUD 050 FS, GRANO® 050 FS, ZAPRAWA NASIENNA 050 FS

Uprawa	Choroby	Dawka
pszenica ozima, pszenica jara	fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy	200 ml środka z dodatkiem 800 ml wody/100 kg ziarna siewnego. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
żyto ozime	fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta, pleśń śniegowa	
pszenżyto ozime	fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa	
pszenżyto jare	fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)	
owies	fuzaryjna zgorzel siewek	
jęczmień ozimy	fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia	
jęczmień jary	fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia	

FLUDIO ŻEL

025 FS



zboża jare
i ozime



**Substancja
aktywna:**

fludioksonil - 25 g/l



INTEGROWANA
PRODUKCJA



Zwalcza szerokie spektrum chorób grzybowych w tym pleśń śniegową, śnieć cuchnącą i zgorzel siewek



Możliwość zaprawiania ziarna na dwa sposoby: bez dodatku wody oraz z dodatkiem wody



Gwarantuje eliminację chorób dzięki pochodnej naturalnego antybiotyku - s.a. fludioksonil



Cechuje się dobrą przyczepnością, dokładnie i równomiernie pokrywa ziarno, nowej generacji pigment zapewnia wysoki stopień wybarwienia



Zawiera składniki biodegradowalne (83%) i pochodzące ze źródeł odnawialnych

Dostępne opakowania: 0,5 l, 2 l Dostępne marki: GRANGELLO 025 FS

Uprawa	Choroby	Dawka
pszenica ozima	fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy	200 ml środka /100kg ziarna siewnego. Zalecana ilość wody: 0 - 800 ml/100 kg ziarna siewnego. Możliwe zaprawianie z i bez dodatku wody. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
pszenica jara	fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy	
żyto ozime	fuzaryjna zgorzel siewek, głównie żdźbłowa żyta	
pszenżyto ozime, jęczmień jary	fuzaryjna zgorzel siewek	
jęczmień ozimy	fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia	

KUPROSAL

25



orzech włoski
i laskowy



jabłoń,
grusza



wiśnia,
czereśnia



brzoskwinie,
śliwy



winorośl,
porzeczki



pomidor,
ogórek



fasola
szparagowa
i pozostałe
uprawy



Skład produktu:

Miedź(Cu) całkowita
- 25.0% (m / m)



Odżywia i likwiduje niedobór miedzi w roślinach
oraz zwiększa odporność roślin na choroby



Przeznaczony do stosowania dolistnego



Zawiera miedź sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi
młodych części roślin, ich późniejszemu wzroście
oraz dojrzewaniu owoców

Dostępne opakowania: 5 l

Forma ciekła

Uprawa	Dawka	Termin stosowania
jabłonie i grusze	1,5 l	Stosować po ruszeniu wiosennej wegetacji od początku kwitnienia: 1-2 zabiegi oraz po zbiorach owoców.
wiśnie	3 l	Stosować po ruszeniu wegetacji i po zbiorach owoców.
czereśnie	1,5 l	Stosować w okresie kwitnienia.

KUPROSAL

25

Uprawa	Dawka	Termin stosowania
śliwy	3 l	Stosować po ruszeniu wegetacji.
	2 - 3 l	Stosować w okresie opadania liści.
brzoskwinie	5 - 7 l	Stosować bardzo wczesną wiosną i jesienią po opadnięciu liści.
pomidor	2 - 2,5 l	2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
ogórek	2 - 2,5 l	Stosować, gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą. Stosować 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
winorośl	3 l	Stosować przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni.
porzeczka	3 l	Stosować przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni.
orzech włoski, orzech laskowy	2 - 3 l	Stosować od momentu pęknięcia pąków do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich. Stosować 1-2 zabiegi w odstępach co 7-14 dni.
fasola szparagowa	2 - 2,5 l	Stosować w czasie kwitnienia i po kwitnieniu. Stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni.
zboża ozime, zboża jare	0,2 - 0,5 l	W okresie wegetacji, do 4 tygodni przed zbiorami.
kukurydza, strączkowe	0,7 - 1,4 l	W okresie wegetacji, do 4 tygodni przed zbiorami.
rzepak	0,4 - 2,2 l	W okresie wegetacji, do 4 tygodni przed zbiorami.
ziemniak	1,7 - 2,5 l	W okresie wegetacji do czasu ostatniego oprysku.
burak cukrowy	1,4 - 2,7 l	W okresie wegetacji do czasu ostatniego oprysku.
pozostałe uprawy	0,5 - 1 l	Stosować w okresie intensywnego wzrostu.

KUPROSAL

50



orzech włoski
i laskowy



jabłoń,
grusza



wiśnia,
czereśnia



brzoskwinie,
śliwy



winorośl,
porzeczki



pomidor,
ogórek



fasola
szparagowa
i pozostałe
uprawy

Skład produktu:

Miedź (Cu) całkowita
- 50,0 % (m/m)



Skuteczne nawożenie roślin sadowniczych
i ogrodniczych



Przeznaczony do stosowania dolistnego



Zawiera miedź sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi
młodych części roślin, ich późniejszemu wzroście
oraz dojrzewaniu owoców



Stosować w czasie wegetacji, w okresach
zwiększonego zapotrzebowania roślin na miedź

Dostępne opakowania: 10 kg

Forma proszkowa

Uprawa	Dawka	Termin stosowania
jabłonie i grusze	1,5 kg/ha	Po ruszeniu wiosennej wegetacji do początku kwitnienia 1-2 zabiegi oraz po zbiorach owoców.
wiśnie i czereśnie	3 kg/ha	Po ruszeniu wegetacji i po zbiorach owoców.
	1,5 kg/ha	Po okresie kwitnienia.

KUPROSAL

50

Uprawa	Dawka	Termin stosowania
śliwy	3 kg/ha	Po ruszeniu wegetacji.
	2-3 kg/ha	W okresie opadania liści.
brzoskwinie	5-7 kg/ha	Bardzo wczesną wiosną i jesienią po opadnięciu liści.
pomidor	2,5-3 kg/ha	2 tygodnie po wysadzeniu rosady, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
ogórek	2,5-3 kg/ha	Gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą. Stosować 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
winorośl	2,5 kg/ha	Przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni.
porzeczki	3 kg/ha	Bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni.
orzech włoski, orzech laskowy	2-3 kg/ha	Od momentu pęknięcia pąków do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich. Stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach 7-14 dni.
fasola szparagowa	3 kg/ha	W czasie kwitnienia i po kwitnieniu. Stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach 7-10 dni.
pozostałe uprawy	0,5-1 kg/ha	W okresie intensywnego wzrostu.

HYDRON



zboża jare
i ozime



kukurydza



rzepak oraz
wiele innych



Skład produktu:

mieszanki
surfaktantów
niejonowych



Zwiększa skuteczność herbicydów doglebowych,
do zastosowania w każdej uprawie



Poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do
cząstek gleby ograniczając ryzyko fitotoksyczności



Zmniejsza szybkość parowania wody z gleby



Poprawia zwilżalność gleby sprzyjając retencji wody
i ograniczając proces wymywania

Dostępne opakowania: 200 ml, 1 l

Dawka	Zastosowanie
Zalecana dawka adiuwantu HYDRON wynosi 0,2 l/ha	Zastosowanie adiuwantu w celu zwiększenia efektywności herbicydu doglebowego w uprawach ozimych i jarych
Zalecane stężenie adiuwantu HYDRON w cieczy roboczej – 0,2 % (1 l / 500 l wody)	Zastosowanie adiuwantu w celu polepszenia uwilgotnienia gleby

OLEO

84 EC



rzepak



kukurydza



zboża jare
i ozime



sady oraz
wiele innych



Skład produktu:

olej mineralny - 84%



Zwiększa efektywność agrochemikaliów stosowanych dolistnie



Zmniejsza zmywalności stosowanego środka przez opady oraz silną rosę



Poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych roślin

Dostępne opakowania: 1 l, 10 l, 20 l

Dawka	Zastosowanie
1,5 l/ha	Można stosować z większością agrochemikaliów, dla których zalecane jest stosowanie z adiuwantem. OLEO 84 EC zalecany jest do stosowania w zabiegach agrarnych na dużych powierzchniach uprawowych.

Ekspert ŚOR radzi:

dodatek adiuwantu jest szczególnie zalecany podczas stosowania z herbicydami, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe lub chwasty w starszej fazie rozwojowej a także, gdy w kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny mogą być narażone na silne opady deszczu.

Intensyfikacja rolnictwa, stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wzrost świadomości konsumentów wymusił podjęcie działań w celu produkowania żywności bezpiecznej zarówno dla zdrowia, jak i z zachowaniem ochrony środowiska naturalnego. Systemem spełniającym te wymagania jest integrowana produkcja roślin. **Integrowana produkcja roślin (IP)** jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Żywność roślinna produkowana zgodnie z zasadami integrowanej produkcji charakteryzuje się wysoką jakością plonów, bez przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. IP jest systemem certyfikowanym, ale dobrowolnym. Urzędem odpowiedzialnym za wydawanie certyfikatów oraz nadzór nad systemem jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wykazy środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w integrowanej produkcji roślin są udostępniane w serwisie internetowym www.agrofagi.com.pl

Produkty Synthos Agro rekomendowane w Integrowanej Produkcji

Środki Ochrony Roślin Synthos Agro rekomendowane w Integrowanej Produkcji				
UPRAWA	HERBICYDY	FUNGICYDY	INSEKTYCYDY	REGULATORY WZROSTU
Rośliny rolnicze	Effendi 500 SC Hiperkan 500 SC Metkan 500 SC Hadar 360 CS Marqis 360 CS Premier® 300 SL Lider 300 SL Premier® 500 SL Premier® 750 SL Lider 750 SL Premier® D 750 SL Lider D 750 DL Mentum 040 OD Tamizan 040 OD Ventto 040 OD Terbut 500 SC Tazoprym 500 SC	FLUDIO 025 FS GRANSELLO 025 FS DIFLUD 050 FS GRANO 050 FS PROSEED 050 FS ZAPRAWA NASIENNA 050 FS Funaben Plus 02 WS		Power Grain 250 EC Tri-Turbo 250 EC Meros 250 EC
Rośliny sadownicze	Orkan 350 SL Sprinter 350 SL	Tores 250 EC Valor 250 EC Bluna 250 EC Ferten 250 EC Hajmon 250 EC Wezen 250 EC Kadi® ReNovo 72,5 WG Kapster® ReNovo 72,5 WG Kapduo® ReNovo 72,5 WG Shavit Gold 72,5 WG Kaptan Gold 80 WG Kaptan Zawieszinowy® 50 WP Winner 50 WP Miedzian® 50 WP Miedzian® Extra 350 SC	Xapiro 05 SC	
Rośliny warzywne		Tores 250 EC Valor 250 EC Bluna 250 EC Ferten 250 EC Hajmon 250 EC Wezen 250 EC Kaptan Zawieszinowy® 50 WP Winner 50 WP Miedzian® 50 WP Miedzian® Extra 350 SC		
Szklarnie stałe: truskawka; rośliny warzywne (ogórka, ogórek, Papryka, pomidor)			Grot® 18 EC	

KIEROWNICY DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW:

-  **Region 1**
+48 601 462 378
-  **Region 2**
+48 605 101 192
-  **Region 3**
+48 605 101 179
-  **Region 4**
+48 887 778 799
-  **Region 5**
+48 506 478 805



synthos
AGRO

Dołącz do nas

-  SynthosAGRO
-  SynthosAGRO ochrona upraw
-  z_mysla_o_polskich_plonach



synthos
AGRO

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
Dział Obsługi Klienta: +48 33 847 47 77
synthos.agro@synthosgroup.com

WWW.SYNTHOSAGRO.COM

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.