



Syntera™

Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy (S)(Cu) 43,6-1,1

Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych (m/m):

43,6% Siarka całkowita (S)

1,1% Miedź całkowita (Cu)

Postać płynna.

Składniki:

Siarka¹ (CAS: 7704-34-9), siarczan miedzi (II) pięciowodny¹ (CAS: 7758-99-8), woda (CAS: 7732-18-5).

¹CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Instrukcje dotyczące stosowania:

Nawóz mineralny w formie zawiesiny do rozcieńczenia w wodzie, zawierający siarkę (S) oraz miedź (Cu) skompleksowaną aminokwasami, przeznaczony do stosowania dolistnego. Służy do nawożenia roślin sadowniczych, rolniczych oraz ogrodniczych. Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na siarkę i miedź. Nawóz stosować, kiedy liście roślin są suche. Nie stosować przed spodziewanym deszczem.

Orientacyjne dawki nawozu i terminy stosowania:

Uprawa	Dawka na hektar	Stosowanie
Drzewa owocowe ziarnkowe (jabłoń, grusza)	5-10 L/ha w 500-750 L wody/ha	Termin stosowania: - na początku wegetacji (BBCH 06-19), - przed kwitnieniem (BBCH 54-56), - po kwitnieniu (BBCH 69-72). Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 1-3 dni.
Drzewa owocowe pestkowe (śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia)	5-10 L/ha w 500-750 L wody/ha	Termin stosowania: - na początku wegetacji (BBCH 06-19), - przed kwitnieniem (BBCH 54-56), - po kwitnieniu (BBCH 69-72). Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 3 dni.
Winorośl	3-5 L/ha w 200-1000 L wody/ha	Termin stosowania: od fazy rozwiniętych pięciu liści Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-8. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Rzepak ozimy	3-5 L/ha w 300-400 L wody/ha	Termin stosowania: <u>jesienia</u> - po wytworzeniu pierwszych 4-6 liści (BBCH 14-16); <u>wiosna</u> - po starcie wegetacji, wzrost pędu głównego (BBCH 32-35); - przed kwitnieniem, na spękanie łodyg (BBCH 50-57). Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.

Zboża ozime	3-5 L/ha w 300-400 L wody/ha	Termin stosowania: <u>jesienia</u> - po wytworzeniu pierwszych 3-4 liści (BBCH 13-14); <u>wiosna</u> - po starcie wegetacji, w fazie krzewienia/strzelania w źdźbło (BBCH 25-32) Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
Zboża jare	3-5 L/ha w 300-400 L wody/ha	Termin stosowania: - po wytworzeniu pierwszych 3-4 liści (BBCH 13-14); - w fazie krzewienia/strzelania w źdźbło (BBCH 25-32) Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
Kukurydza	3-5 L/ha w 300-400 L wody/ha	Termin stosowania: po wytworzeniu pierwszych 2-6 liści (BBCH 12-16) Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Burak cukrowy, burak pastewny	3-5 L/ha w 300-400 L wody/ha	Termin stosowania: od fazy dziewięciu lub więcej liści do fazy, gdy korzeń osiągnie wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 19-49) Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Ziemniak	3-5 L/ha w 300-400 L wody/ha	Termin stosowania: od fazy rozwoju liści (BBCH 21) Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Cebula, por, czosnek	1,5-2,5 L/ha w 600 L wody/ha	Termin stosowania: od fazy 3-4 liścia właściwego (faza intensywnego wzrostu) Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

Pomidor (w uprawie polowej)	2-3 L/ha w 600 L wody/ha	Termin stosowania: po przyjęciu rozsady do fazy tuż przed kwitnieniem Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Papryka (w uprawie polowej)	2-2,5 L/ha w 500-1000 L wody/ha	Termin stosowania: po przyjęciu rozsady do fazy tuż przed kwitnieniem Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Marchew, pietruszka	1,5-2 L/ha w 400-600 L wody/ha	Termin stosowania: od fazy 2 liścia do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Seler	2-2,5 L/ha w 400-600 L wody/ha	Termin stosowania: od fazy intensywnego wzrostu po przyjęciu rozsady do fazy, gdy zgrubienie osiąga typową wielkość Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Kapusta (różne rodzaje), brokuł, kalafior	3-4 L/ha w 200-600 L wody/ha	Termin stosowania: od fazy przyjęcia się rozsady do fazy, gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Burak ćwikłowy	2-2,5 L/ha w 300-400 L wody/ha	Termin stosowania: od fazy dziewięciu lub więcej liści do fazy, gdy korzeń osiągnie wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 19-49) Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Soja, fasola, groch, bób, lubin soczewica	1,5-2 L/ha w 600 L wody/ha	Termin stosowania: po wykształceniu liści do fazy, gdy 50% strąków dojrzało Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Rośliny szkółkarskie leśne i ozdobne	1,5-3 L/ha w 600 L wody/ha	Termin stosowania: od początku rozwoju liści i pędów Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych	5-10 L/ha w 500-750 L wody/ha	Termin stosowania: od początku rozwoju liści pędów Rekomendowana liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Przed zastosowaniem należy uwzględnić potrzeby poszczególnych upraw oraz warunków ich uprawy.

Przed sporządzeniem mieszaniny z innymi nawozami lub środkami ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza, należy wykonać test próbnego mieszania w małej objętości wody.

Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie - instrukcji środka stosowanego łącznie z nawozem.

Przygotowanie cieczy użytkowej

Przed sporządzeniem cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Przed przygotowaniem roztworu mieszaniny zbiornikowej z innymi agrochemikaliami należy przeprowadzić test kompatybilności fizycznej.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz roboczą zużyć w tym samym dniu, w którym została przygotowana.

Skontaktuj się z firmą Synthos Agro Sp. z o.o. lub z dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zalecane warunki przechowywania i transportu:

- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Chronić przed wilgocią.
- Nawóz przechowywać wyłącznie w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0 do 30°C z dala od źródeł ciepła, środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych zwłaszcza dzieci.

Informacje dotyczące niebezpieczeństwa i ochrony środowiska:



Uwaga

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

Synthos Agro Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 847 47 77.

www.synthosagro.com

synthos
AGRO

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stosować tylko w razie konieczności – zaobserwowania niedoborów siarki i miedzi w roślinie. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia fitotoksyczności nawóz należy stosować zgodnie z rekomendacjami zawartymi w etykiecie.

Nie stosować w ciągu dnia tam, gdzie pszczoły mają pożytek.

Chronić przed dziećmi.

Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy, zabezpieczającą w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Masa netto:

Postać: ciecz

Okres przydatności:

2 lat od daty produkcji (na opakowaniu)

Producent:

SYNTHOS AGRO Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

tel.: +48 33 847 47 77,

e-mail: rejestracja@synthosgroup.com

Numer partii produktu: